



Brug af ansigtsværnemidler



Hvornår skal du bruge ansigtsværnemidler?



Ved hosteprovokerende procedurer

fx sondeanlæggelse, dysfagiundersøgelse



Ved aerosoldannende procedurer

fx tracheal-sugning, C-PAP og NIV behandling



Ved procedurer med risiko for stænk og sprøjt

med humanbiologisk materiale i slimhinder i ansigtet fx fødsler eller sårskylning

Der er krav om anvendelse øjenbeskyttelse og maske ved:

- Isolation med dråbesmitte

Samt krav om brug af maske:

- Ved sterile procedurer
- På operationsstuer

Herudover kan der være krav om brug af ansigtsværnemidler ved arbejdsmiljømæssige forhold fx kirurgisk røg eller stænk og sprøjt af kemikalier



Korrekt brug af ansigtsværnemidler

Næseklemmen på maske tilpasses næseryg

Maske fastgøres med begge bindebånd/ elastikker

Full face visir kan erstatte beskyttelsesbriller, men erstatter ikke brug af maske

Maske skal dække både mund og næse



Almindelige briller kan ikke erstatte øjenbeskyttelse

Du skal bære ansigtsværnemidler fordi:

- Slimhinder i dine øjne, næse og mund er indgangsport for mikroorganismer
- Du kan få en infektion i øjne eller luftveje
- Såfremt du bliver smittet, kan du videregive smitten til andre