



Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination Anbefalinger fra CEI

Sprøjte med indhold leveres klargjort, eller det ønskede indhold trækkes op ved hjælp af aseptisk teknik.

- Hænder desinficeres.
- Indstiksstedet desinficeres med ethanol 70-85 % (v/v).
- Vaccinen injiceres.
- Sprøjte med kanyle bortskaffes i egnet beholder (fx kanyleboks).
- Plaster e.l. påsættes injektionsstedet.
- Hænder desinficeres.

I forbindelse med vaccinationen bæres maske (alternativt visir) af den, der vaccinerer. Den, der vaccineres, bærer ligeledes mundbind/maske eller visir, jf. Sundhedsstyrelsens "Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 – første udrolning" (22. dec. 2020) samt "Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19" (23. dec. 2020).

Der bruges handsker ved risiko for kontakt med blod, disse skiftes mellem hver patient, og der udføres håndhygiejne efterfølgende. Handsker er til engangsbrug og må ikke desinficeres. Ur, ringe og andre håndsmykker er ikke forenelige med god håndhygiejne.

Der er ikke behov for andre værnemidler (fx overtrækskittel), medmindre der er tale om anden smitterisiko (fx MRSA).

Vær opmærksom på risiko for personalesmitte - husk afstand, når der ventes i kø til vaccination. Masken er kun et supplerende tiltag – afstand er fortsat vigtig! Sørg for ventilation i form af regelmæssig udluftning i rummet ved længerevarende vaccinationsseancer.