

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område

Dato	Type af ændring	Overordnet emne	Kommentar	Hvor i tidl. Udgave	Tekst i tidl. udgave	Ændret til
Maj 2015 Udg. 1.1	Forside billede		Ændret til et billede med lange ærmer.	Forsiden		
Rettelser til udg. 1. 2015	Sproglig formulering	Peroperativ behandling af patienten	Måden hvorpå man desinficerer huden før operation, kan udføres på mange måder.	Side 17 (blå boks)	Fremgangsmåde for hud-desinfektion.... Huden skal være synligt ren. Der desinficeres to gange med sterile tamponer eller servietter. Iført sterile handsker og eventuelt med anvendelse af en steril peán bearbejdes huden med tamponer eller servietter godt gennemvædet med desinfektionsmiddel, da den mekaniske effekt er vigtig.	Fremgangsmåde for hud-desinfektion... Huden skal være synligt ren. Huddesinfektion er en aseptisk procedure, der kan foretages med en steril peán, sterile handsker eller en kombination af begge. Huden bearbejdes med tamponer eller servietter godt gennemvædet med desinfektionsmiddel, da den mekaniske effekt er vigtig.
	Sprog og metode er ændret	Bilag 2. Rengøring og desinfektion på operationsstuen	Hele afsnittet er skiftet ud og er identisk med afsnittet i NIR For rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler, der er publiceret den 22. maj 2015	Side 30	Hele afsnittet er ændret	Hele afsnittet er erstattet med det der er publiceret i NIR Rengøring

Dato	Type af ændring	Overordnet emne	Kommentar	Hvor i tidl. Udgave	Tekst i tidl. udgave	Ændret til
	Styrke af anbefaling ændret	Bilag 3. Infektionsfølsomhed og adfærd på operationsstuen	Ved kirurgisk maske i infektionsfølsomhed høj, stuetype 4+5, er bør ændret til et skal.	I bilag 3 side 34	Bæres af OP-teamet og af usteril hjælper under udpakning. Personer tættere end 1 m på sterilt område bør bære maske	Bæres af OP-teamet og af usteril hjælper under udpakning. Personer tættere end 1 m på sterilt område skal bære maske